



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°19 du 26 juillet 2000 - 1 page

Cultures Légumières

ARTICHAUT

MILDIOU

COTES D'ARMOR

Dans certaines parcelles de drageons, des attaques de mildiou sont toujours observées.

Dans les parcelles où des attaques sont observées, réalisez un traitement avec du mancozèbe (nombreuses spécialités), REMILTINE à 2 kg/ha, RHODAX à 2,5 kg/ha ou PULSAN à 2 kg/ha.

PUCERONS

COTES D'ARMOR

Depuis la semaine passée, les populations de pucerons noirs sont toujours en progression dans la plupart des parcelles de drageons. Dans les parcelles en cours de récolte, le niveau des populations de pucerons est peu élevé.

Les prédateurs, punaises, chrysopes et coccinelles sont toujours présents et actifs.

Surveillez vos parcelles. En règle générale, il est encore trop tôt pour intervenir contre les pucerons et la présence des auxiliaires devrait permettre la régulation des populations de pucerons.

Toutefois, dans quelques rares cas un traitement peut être justifié. Intervenez avec PIRIMOR G à 0,75 kg/ha ou BEST à 1,5 l/ha.

ILLE ET VILAINE

Dans les parcelles de drageons, les populations de pucerons noirs ont légèrement progressé depuis la semaine dernière.

Les populations de pucerons verts sont restées stables.

Quelques prédateurs, punaises et chrysopes sont toujours présents et actifs.

En règle générale, il est encore trop tôt pour intervenir contre les pucerons.

CULTURES BIOLOGIQUES

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR

Les populations de pucerons verts restent très faibles.

Dans les parcelles de drageons les populations de pucerons noirs restent localisées. Certains pieds sont sérieusement infestés mais on constate une régulation importante par les auxiliaires (punaises prédatrices, coccinelles, pontes de chrysopes...).

Dans les parcelles plus âgées, les populations de pucerons noirs restent à des niveaux peu élevés et sont généralement localisées.

Dans les parcelles en cours de récolte, il est inutile de traiter, les auxiliaires contrôlent les populations de pucerons présents. Durant la récolte, éliminez manuellement les têtes plus sérieusement atteintes.

Pour les parcelles plantées cette année, la date d'apparition des capitules étant encore éloignée, il n'est pas non plus nécessaire d'intervenir. Cependant, il est possible d'utiliser localement des produits à base de roténone sur les pieds les plus touchés (voir tableau du bulletin d'Avertissements Agricoles n° 17 du 12 juillet 2000). On rappelle que l'effet néfaste de la roténone sur la faune auxiliaire doit conduire à un usage limité de ces produits.

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons verts et noirs restent à des niveaux faibles.

La présence d'auxiliaires contrôle bien les populations d'aphidiens. Il est inutile d'intervenir contre les pucerons.



Prochain
numéro le
2 août 2000



Artichaut:
augmentation des
populations de
pucerons noirs.

DRAF Bretagne
Service Régional de la
Protection des Végétaux
B.P. 60116
35701 RENNES CEDEX

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rennes
Directeur gérant :
P. BLANCHET
Publication périodique
C.P.A.P. n°528 AD
ISSN n°1167-2382

Tarif Courrier 555 Frs - Fax
655 Frs

727